

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Cité Administrative, rue Pélissier, 63034 Clermont Ferrand Cedex

Téléphone (73) 92-42-68 - Poste 469

ABONNEMENT ANNUEL :

85,00 F

Régie de Recettes de la D.D.A.
Sous-Régisseur de Recettes
du Service de la Protection
des VégétauxCité Administrative - Rue Pélissier
63034 Clermont Ferrand Cedex
C. C. P. Clermont-Ferrand 5.503-17

BULLETIN N° 5 du 19 MARS 1982 (ÉDITION GÉNÉRALE)

REPONDEURS TELEPHONIQUES

En accord avec les Stations de la Météorologie
ou des Chambres d'Agriculture, des flashes d'informations seront diffusés
sur les répondeurs téléphoniques suivants :

- ALLIER	VICHY	: 32.34.59
	MONTLUÇON	: 28.03.50
- PUY-DE-DOME	AULNAT	: 91.82.82
- CORREZE	TULLE	: 26.92.22
- HAUTE-VIENNE	LIMOGES	: 77.32.32

TAVELURE DU POMMIER

Les germes (périthèces) contenus dans les feuilles
tombées au sol à l'automne arrivent à maturité (ALLIER et PUY-DE-DOME).

Un traitement fongicide est à envisager dès que le
stade sensible C3 sera atteint (consulter le tableau des stades repères transmis
récemment).

TAVELURE DU POIRIER

Les premières émissions d'ascospores ont été consta-
tées depuis le 26 Février en laboratoire pour la région du VERNET (Allier) et le
17 Mars dans la nature, à la Station de MARMILHAT, suite aux pluies du 16.

En raison de la croissance de la végétation, une nouvelle
application est conseillée.

P.1.169

- Produits homologués ou en autorisation de vente contre les tavelures

FAMILLE	MATIERE ACTIVE	SPECIALITES COMMERCIALES (non limitatif)
AMINES	triforine	SAPROL
BENZIMIDAZOLES *	bénomyl carbendazime thiophanate méthyl	BENLATE Nombreuses spécialités PELT 44
DITHIOCARBAMATES	carbatène mancozèbe manèbe propinèbe thirame zinèbe zirame	TRIONEB DITHANE M 45, SANDOZEBE Nombreuses spécialités ANTRACOL Nombreuses spécialités Nombreuses spécialités Nombreuses spécialités
DIAZINES	fénarimol	RIMIDINE, RUBIGAN
GUANIDINE *	doguadine	DODINAL, MELPREX
PHTALIMIDES	captafol captane folpel	DIFOSAN, ORTHODIFOLATAN Nombreuses spécialités Nombreuses spécialités
QUINONES	dithianon	DELAN
QUINOLEINE	oxyquinoléate de cuivre	QUINOLATE 400
SULFAMIDES	tolyfluanide	METHYLEUPARENE

* En raison de la présence de souches résistantes à la tavelure, ces produits sont à réserver pour les traitements de rattrapage.

GRANDES CULTURES

C O L Z A

CHARANÇON DE LA TIGE

Il est rappelé que la période de sensibilité de la culture à ce ravageur, s'étale du stade C2 (entre-noeuds visibles jusqu'au moment où la tige atteint une hauteur de 20 cm).

- Dans le département de la HAUTE-LOIRE (région de BRIOUDE), les captures pratiquement inexistantes jusqu'à présent deviennent importantes depuis le 16 Mars : un traitement est conseillé dans le courant de la semaine prochaine.

- Dans les départements de l'ALLIER, de la CREUSE et du PUY-de-DOME, suivre les indications données dans notre dernier bulletin.

- Dans le département de la HAUTE-VIENNE, le nombre de captures étant nulle ou extrêmement faible, il n'y a pas lieu d'intervenir contre ce ravageur.

• RECTIFICATIF

Dans le tableau joint à notre dernier bulletin concernant les produits de traitement sur les divers insectes du colza, il y a lieu d'ajouter :
Ex. dans la case charançon des siliques pour le BROMOPHOS (SOVINEXION).

CEREALES

Les premières fiches du réseau d'observations céréales nous parviennent :

• BLE

Pour les semis précoces effectués dans le courant du mois d'Octobre, le stade 6 (premier noeud visible) est atteint.

Pour les semis tardifs les stades 4 et 5 (commencement du redressement à fin du redressement) sont notés.

Les températures fraîches enregistrées à partir du 5 Mars ont ralenti la végétation.

Toutefois, dans les parcelles de semis précoces, il y a lieu d'effectuer les premiers sondages sur 25 pieds par parcelle afin d'examiner la base des talles.

Il est rappelé qu'un traitement contre les maladies du pied (piétin verse en particulier) doit être réalisé si 20 à 25 % des talles sont atteintes par des attaques profondes (dernière gaine touchée).

• ORGE





Selon les dates de semis, les stades 5 - 6 redressement à premier noeud visible sont atteints.

Dans le cas d'attaques précoces de rhynchosporiose un traitement s'avère nécessaire dès que l'on note la présence des premiers symptômes.

Les renseignements fournis par le réseau sont encore fragmentaires.

De nouvelles indications seront prochainement fournies par la Station d'Avertissements Agricoles.

LES MALADIES DU PIED (Différents symptômes)

Maladie	PIETIN ECHAUDAGE	PIETIN VERSE	FUSARIOSE	RHIZOCTONE
Organe				
RACINES	- desséchées, nécrosées noires et brillantes	- saines	- pourriture "brun clair", en partie détruites	- en partie détruites
BASE DE LA TIGE	 <p>Base de la tige noire brillante. En fin de végétation. Présence de Périthèces noirs.</p>	 <p>Taches ocellées Stromas</p>	 <p>Brune avec stries foncées.</p>	 <p>Taches jaunes bordées de brun. Aspect festonné.</p>

STADES DE DEVELOPPEMENT DES CÉRÉALES (Echelle de FEEKES - LARGE)

